

Surveillance für Influenza und andere akute respiratorische Erkrankungen (ARE)

Wochenbericht 45/2025



Epidemiologische Lage:

Die Anzahl der Arztbesuche wegen akuter Atemwegsinfektionen liegt in einem für die Jahreszeit typischen moderaten Bereich. Die Virologische Surveillance zeigt, dass vor allem gewöhnliche Erkältungsviren und SARS-CoV-2 zirkulieren. Die COVID-19-Fallzahlen (IfSG) sind auf niedrigem Niveau gestiegen. Der Anstieg von Influenza hat sich zunächst nicht weiter fortgesetzt. RSV-Meldungen erfolgen vereinzelt.


Wöchentliche Meldungen nach Infektionsschutzgesetz

(Falldefinition erfüllt: ja, Referenzdefinition erfüllt: ja und nein)


Meldelandkreis	COVID-19		Influenza		RSV	
LK Altmarkkreis Salzwedel	9	↗	1	↗	0	-
LK Anhalt-Bitterfeld	18	→	1	↗	0	-
LK Börde	33	↗	5	↗	2	↗
LK Burgenlandkreis	31	↗	3	↘	0	-
LK Harz	12	↘	0	-	0	-
LK Jerichower Land	10	↘	0	-	0	-
LK Mansfeld-Südharz	17	↗	4	↗	0	↘
LK Saalekreis	18	↗	5	→	1	→
LK Salzlandkreis	46	↗	2	→	0	-
LK Stendal	12	↗	2	↗	0	-
LK Wittenberg	20	↗	4	↘	0	-
SK Dessau-Roßlau	8	↗	1	↘	0	-
SK Halle	33	↗	3	↘	0	-
SK Magdeburg	27	→	4	↘	1	↗
Sachsen-Anhalt	294	↗	35	↘	4	↗
Gesamt 36. - 45. MW	1.737		185		30	
davon Sterbefälle	7		1		0	

↗, ↘ Änderung um mehr als 10 % zur Vorwoche


Influenza-Meldefälle (IfSG) in Sachsen-Anhalt




Aufgrund von Influenza hospitalisierte Meldefälle (IfSG) in Sachsen-Anhalt




COVID-19-Meldefälle (IfSG) in Sachsen-Anhalt




Aufgrund von COVID-19 hospitalisierte Meldefälle (IfSG) in Sachsen-Anhalt



RSV-Meldefälle (IfSG) in Sachsen-Anhalt



Aufgrund von RSV hospitalisierte Meldefälle (IfSG) in Sachsen-Anhalt




Altersgruppen: ■ unter 2 Jahre ■ 2 - 6 Jahre ■ 7 - 17 Jahre ■ 18 - 59 Jahre ■ ab 60 Jahre


Im Rahmen der erweiterten Surveillance „Akuter respiratorischer Erkrankungen“ (ARE) senden ausgewählte Kinderarztpraxen aus Sachsen-Anhalt ganzjährig stichprobenartig gewonnene Rachenabstriche von Kindern und Jugendlichen mit akuten Atemwegsinfektionen an das LAV. Hier werden die Proben auf Influenzaviren, auf SARS-CoV-2 und auf andere ARE-Erreger untersucht.

In der 45. Kalenderwoche wurden in 38 untersuchten ARE-Proben 6-mal SARS-CoV-2, 1-mal Adenoviren, 7-mal Picornaviren und 1-mal Parainfluenzavirus-4 nachgewiesen. Es gab 7 Mehrfachinfektionen.


Proben



Viren




Bakterien



Hinweis: Bei weniger als 10 Proben werden keine Positivraten dargestellt.

Tägliche Belegung der ITS mit COVID-19-Fällen in Sachsen-Anhalt (Datenquelle: DIVI-Melderegister)



<https://www.intensivregister.de/#!/aktuelle-lage/zeitreihen>

ARE-Konsultationsinzidenz in Sachsen-Anhalt

<https://public.data.rki.de/t/public/views/ARE-Dashboard/Arztpraxen?%3Aembed=y&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y>

Hinweis: Oben links bei "Auswahl Bundesland" auf Sachsen-Anhalt filtern.

Bundesweite Hospitalisierungsinzidenz schwerer akuter respiratorischer Infektionen (SARI)

<https://public.data.rki.de/t/public/views/ARE-Dashboard/Krankenhaeuser?%3Aembed=y&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y>

Abwassermonitoring von SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt

<https://verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de/gesundheits/wasserhygiene/trinkwasser-1/abwassermonitoring-von-sars-cov-2-in-sachsen-anhalt>