

Surveillance für Influenza und andere akute respiratorische Erkrankungen (ARE)

Wochenbericht 8/2026



Epidemiologische Lage:

Die Influenza-Welle hält noch an, hat ihren Höhepunkt jedoch überschritten. Die RSV-Meldezahlen sind in der 8. MW weiter gestiegen. In der Sentinelsurveillance des LAV wurden v.a. Influenza-A/H3N2-Viren nachgewiesen, gefolgt von gewöhnlichen Erkältungsviren, Influenza-A/H1N1-pdm09-Viren, RSV und humanen Metapneumoviren. Die Anzahl der Arztbesuche wegen akuter Atemwegsinfektionen nimmt - insbesondere in der besonders betroffenen Altersgruppe der Kleinkinder - in Sachsen-Anhalt deutlich ab. Auch schwer verlaufende Atemwegserkrankungen nehmen bundesweit über alle Altersgruppen ab.

Wöchentliche Meldungen nach Infektionsschutzgesetz

(Falldefinition erfüllt: ja, Referenzdefinition erfüllt: ja und nein)


Meldelandkreis	COVID-19		Influenza		RSV	
LK Altmarkkreis Salzwedel	3	→	54	↘	11	↗
LK Anhalt-Bitterfeld	5	→	85	→	45	↗
LK Börde	6	↘	191	→	61	↗
LK Burgenlandkreis	4	↗	58	↘	25	↗
LK Harz	4	↘	143	↘	38	↘
LK Jerichower Land	1	↘	94	↘	25	↗
LK Mansfeld-Südharz	4	↘	87	↘	27	→
LK Saalekreis	5	↗	78	↘	75	↗
LK Salzlandkreis	11	↘	216	↘	66	↗
LK Stendal	6	↗	118	↘	27	↗
LK Wittenberg	6	↗	74	↘	40	↗
SK Dessau-Roßlau	8	↗	74	↘	38	↗
SK Halle	7	↘	72	↘	64	→
SK Magdeburg	12	↘	221	↘	67	↗
Sachsen-Anhalt	82	↘	1.565	↘	609	↗
Gesamt 36. - 8. MW	6.888		12.249		2.120	
davon Sterbefälle	64		71		1	

↗, ↘ Änderung um mehr als 10 % zur Vorwoche

Dashboard zu meldepflichtigen Infektionskrankheiten in Sachsen-Anhalt:


<https://verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de/das-lav/wochenbericht-zum-thema-gesundheit>

Hinweis: Im Gegensatz zum ARE-Bericht werden im Dashboard nur die wöchentlichen Meldungen nach dem Infektionsschutzgesetz mit erfüllter Referenzdefinition veröffentlicht.




Im Rahmen der erweiterten Surveillance „Akuter respiratorischer Erkrankungen“ (ARE) senden ausgewählte Arztpraxen (darunter v.a. Kinderarztpraxen) aus Sachsen-Anhalt stichprobenartig gewonnene Rachenabstriche von Patientinnen und Patienten mit akuten Atemwegsinfektionen an das LAV. Hier werden die Proben auf Influenzaviren, auf SARS-CoV-2 und auf andere ARE-Erreger untersucht.

In der 8. Kalenderwoche wurden in 50 untersuchten ARE-Proben 20-mal Influenza (3-mal Influenza A/H1N1-pdm09, 17-mal Influenza A/H3N2), 3-mal RSV(A/B), 1-mal Adenoviren, 6-mal Picornaviren, 5-mal Human-Bocavirus, 3-mal Humane Coronaviren und 2-mal hMPV nachgewiesen. Es gab 9 Mehrfachinfektionen.



Hinweis: Bei weniger als 10 Proben werden keine Positivraten dargestellt.

Tägliche Belegung der ITS mit COVID-19-Fällen in Sachsen-Anhalt (Datenquelle: DIVI-Melderegister)



<https://www.intensivregister.de/#!/aktuelle-lage/zeitreihen>

ARE-Konsultationsinzidenz in Sachsen-Anhalt

<https://public.data.rki.de/t/public/views/ARE-Dashboard/Arztpraxen?%3Aembed=y&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y>

Hinweis: Oben links bei "Auswahl Bundesland" auf Sachsen-Anhalt filtern.

Bundesweite Hospitalisierungsinzidenz schwerer akuter respiratorischer Infektionen (SARI)

<https://public.data.rki.de/t/public/views/ARE-Dashboard/Krankenhaeuser?%3Aembed=y&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y>

Abwassermonitoring von SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt

<https://verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de/gesundheits/wasserhygiene/trinkwasser-1/abwassermonitoring-von-sars-cov-2-in-sachsen-anhalt>